

TRAITEMENT DU PSORIASIS

INFORMATIONS DESTINEES AUX PATIENTS



**Recommandation d'usage:
L'unité «bout de doigt»**



LEO Pharma

Eichwatt 5 · 8105 Regensdorf-Watt



Votre médecin vous a prescrit différentes mesures thérapeutiques (médicaments, soins, etc.) pour traiter votre peau. Respectez ces prescriptions et utilisez les médicaments conformément aux recommandations de votre médecin, en accord avec la présente carte. Le succès du traitement dépend fortement de son application régulière et correcte.

15 minutes pour votre peau

Avant le traitement de votre peau, créez une atmosphère agréable. Le sentiment de bien-être qui en résultera augmentera votre envie de répéter le traitement.

Commencez par prendre un bain ou une douche, puis séchez votre peau en la tamponnant avec une serviette sans frotter. Traitez ensuite spécifiquement les zones de peau affectées, puis appliquez un produit de soins neutre sur les zones saines.



L'unité «bout de doigt»

Le dosage correct du médicament (pommade, crème, etc.) est très important. Un sous-dosage compromet l'efficacité, tandis que les effets peuvent être trop forts en cas de surdosage. Il est donc utile de disposer d'une unité de dosage. L'illustration à droite définit une unité «bout de doigt».



Règle générale

Une unité «bout de doigt» (0.5 g) suffit pour le traitement d'une surface correspondant à celle couverte par deux mains posées à plat.

Exemple

En supposant que le psoriasis couvre une surface de 6 mains, vous aurez besoin de 3 unités «bout de doigt» par application.

